

Болести и неприятели по ягодата и малината през май

Автор(и): проф. д.с.н Иванка Лечева; проф. Мария Боровинова

Дата: 24.05.2019 Брой: 5/2019



При **малината** пръсканията са насочени срещу дидимела, антракноза, засъхване основите на летораслите/лептосфериоза/, сиво гниене, малинов агрилус, малиново комарче, малинова галица и малинов бръмбар. Срещу болестите се използва един от фунгицидите: Дитан М45 – 0,2%, Косайд 200 ВГ – 0,12%, Фунгуран ОН 50ВП – 0,15% и Купросейт голд М – 0,15%. За борба срещу вредителите по малината няма инсектицид, който да е включен в списъка на разрешените за употреба продукти за растителна защита. По данни на Цолова, 2002 г. инсектицидите Би-58 – 0,1%, Карате зеон – 0,02%, Вазтак нов – 0,015% и Децис 2,5ЕК – 0,04% са ефикасни срещу посочените неприятели. Авторката препоръчва първите два инсектицида да се използват при първото, а останалите два при второто пръскане. При поява на акари се прилата нимазал TS в концентрация 0,3-0,5%. Този биопрепарат засяга листните въшки и цикадите.

Ягодовите насаждения през май се пръскат срещу сиво гниене, брашнеста мана, ягодово хоботниче, ягодово стъблехоботниче. Срещу сивото гниене се използва един от фунгицидите: Суич 62,5ВГ – 100г/дка, Сигнум ВГ – 75г/дка, Синпро СК – 150мл/дка, Каптан – 150г/дка, тирам 80ВГ – 0,3%, Шавит Ф ВДГ – 0,2%, Пролектус 50ВГ – 80-120 г/дка. За опазване на ягодата от брашнеста мана се

пръска с един от одобрените фунгициди: Систан 20ЕВ – 30мл/дка, Систан екозом ЕВ – 55-130 мл/дка, Цидели топ ДК -10мл/дка, Ортива топ СК – 100мл/дка, Шавит Ф 72ВДГ – 0,2%, Тиовит джет 80ВГ – 500г/дка. От изброените фунгициди Цидели топ ДК е ефикасен и срещу белите листни петна.

Срещу хоботничетата се използва Авант 150 ЕК – 25 мл/дка или Калипсо 480 СК – 20 мл/дка.