

Болестите отстъпват, неприятелите настъпват

Автор(и): Растителна защита

Дата: 21.06.2016



За опазване на зеленчуковата и плодовата реколта е необходимо да продължи борбата срещу вредителите и през втората половина на юни и през юли.

Поради по-високите температури на въздуха и на почвата през този период е задължително да се пръска сутрин рано или вечер. Валежите са малко и се увеличава дефицитът на въздушна влага. Плодовете наедряват интензивно, а нарастването на летораслите завършва. В резултат на високите въздушни температури се наблюдават повреди по плодовете, наречени „слънчев пригор“.

Много важно е да се събират окапалите плодове и да се изнасят извън овощните градини, за да се намали плътността на неприятелите и степента на зараза от болести.

Засушаването не е много благоприятно за развитието на бактериалните и гъбни болести по културите е по-ограничено, но е “добре дошло” за намножаването на неприятелите - плодови червеи, акари, миниращи и гроздови молци, бяла американска пеперуда, листните въшки.

Зеленчуци

Основни вредители за периода

- Картофена мана по дамат

- Кафяви листни петна /Алтернария/ по домати
- Брашнеста мана по домати
- Бели листни петна по домати
- Бактерийно струпясване по домати
- Кубинска мана по тиквовите
- Брашнеста мана по тиквовите
- Листни въшки по зеленчуковите култури
- Голи охлюви

Картофи

Основни вредители за периода

- Мана по картофите
- Кафяви листни петна /Алтернария/ по картофите
- Колорадски бръмбар
- Листни въшки

Овощни култури

Основни вредители за периода

- Ябълков плодов червей
- Сливов плодов червей
- Източен плодов червей
- Калифорнийска щитоносна въшка
- Бяла американска папаруда
- Червен овощен акар
- Кръгломинаращ молец
- Обикновена крушова листна бълха
- Листни въшки по овощните видове
- Струпясване по ябълка и круша
- Брашнеста мана по ябълка
- Брашнеста мана по праскова

Лоза

Основни вредители за периода

- Брашнеста мана /оидиум/
- Мана
- Сиво гниене
- Жълт лозов акар
- Шарен гроздов молец