

Растителнозащитни грижи през юли при лоза

Автор(и): гл.експерт Татьяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 06.07.2017 Брой: 7/2017



В този период лозите се намират от фенофаза „край на цъфтежа“ до „начало на узряване на зърната“ на раните сортове.

Основни вредители за периода

Мана по лозата *Plasmopara viticola*

Брашнеста мана *Oidium tuckeri*

Сиво гниене *Botrytis cinerea*

Бактериален рак *Agrobacterium vitis*

Шарен гроздов молец *Lobesia botrana*

Лозова пъстрянка *Theresimima ampellophaga*

Лозова щитовка *Pulvinaria vitis*

Жълт лозов акар *Schizotetranychus viticola*

Бактериален рак

При заразените растения по вдървесинените части, близо до повърхността на почвата или непосредствено под почвената повърхност, се забелязват подутини (тумури). Болните растения имат потиснато развитие, хлоротични листа и лесно измръзват при студена зима.

Стратегия за контрол на вредителя:

През месец юли, лозите с признаци на болестта, задължително се маркират.

Лозова щитовка

Излюпването на ларвите продължава и през първата половина на юли. Вредят като смучат сок от листата, леторастите и чепките на грозда. Линеят един път, хранят се известно време, след което напускат местата на хранене и се преселват по местата на зимуване. Вследствие на повредата лозите се изтощават.

Стратегия за контрол на вредителя:

Химичен контрол се провежда срещу младите ларви.

Разрешен продукт за растителна защита:

мовенто 100 ск - 0,075-0,095%;