

Метеорологична прогноза за втората половина на август

Автор(и): Растителна защита
Дата: 23.08.2017 Брой: 8/2017



Вследствие високите температури през първата половина на август в югозападните райони на страната (района на Петрич), по-рано от обичайните срокове, започна гроздобера на белите винени сортове Мускат отонел и Шардоне.

През първата половина на периода прогнозираните наднормени температури ще ускорят последните фази от развитието на късните земеделски култури. В края на второто десетдневие при средно ранните хибриди царевица ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост. През периода при средно късните хибриди ще протича млечна и преход към восъчна зрелост, а при късните – наливане на зърното. При слънчогледа в полските райони ще преобладава техническа зрелост. В началото на третото десетдневие при соята ще се наблюдава фаза узряване, при памука - начало на разпукуване на плодните кутийки, при ориза - фаза млечна зрелост. Част ранните бели винени сортове грозде в Южна България ще встъпят в технологична зрелост.

Вследствие високите температури през първата половина на август в югозападните райони на страната (района на Петрич), по-рано от обичайните срокове, започна гроздобера на белите винени сортове Мускат отонел и Шардоне.

През втората половина от периода се прогнозира съществено понижение на температурите и промяна в агрометеорологичните условия. Очакваните валежи, закъснели за част от пролетните култури в източните и южни райони на страната, ще подобрят водно-физичното състояние на почвата в орния слой, което е предпоставка за по-качествено провеждане на дълбоката оран и предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване с рапица. През третото десетдневие на август започват агротехническите срокове за сеитбата на зимна рапица.

Подходящи условия за провеждане жътвата на слънчогледа, започнала на места в Южна България, ще има през първата половина от периода.

Източник: НИМХ-БАН