Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Вероятност за поява на гъбни болести в средата на месец май

Автор(и): Растителна защита
Дата: 15.05.2018 *Брой:* 5/2018

Прогнозираните температури и чести валежи през периода ще създават условия за заразяване и развитие на гъбни болести като: струпясване по семковите овощни видове, сачмянка и ранно кафяво гниене по костилковите, сиво гниене по ягодите, мана по лозата и др.

В средата на месец май агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време и температури близки до климатичните норми за второто десетдневие на май.

Очакваните валежи през периода ще подобрят почвените влагозапаси в 50 cm слой и условията за развитие на есенните посеви и засетите пролетни култури. Падналите валежи в края на първото десетдневие на май бяха неравномерно разпределени. На места в полските райони валежите бяха под 10 l/m², без особено стопанско значение. Значителни количества, над 25-30 l/m², са измерени в част от Дунавската равнина и в Източна България. В района на Стара Загора пороен дъжд, над 50 l/m², причини полягане при част от посевите със зимни житни култури.

През периода при слънчогледа и царевицата ще протича листообразуване. При зимните житни култури ще се осъществява цъфтеж, оплождане, формиране и наливане на зърното. В края на второто десетдневие част от посевите с ечемик и пшеница в южните райони ще встъпят в начало на

фаза млечна зрелост, по-рано от обичайните за страната срокове. Зимната рапица е в репродуктивен стадий от развитието си.

Прогнозираните температури и чести валежи през периода ще създават условия за заразяване и развитие на гъбни болести като: струпясване по семковите овощни видове, сачмянка и ранно кафяво гниене по костилковите, сиво гниене по ягодите, мана по лозата и др.

През второто десетдневие на май при ранните сортове череши ще се наблюдава фаза узряване. През този период при среднорannите сортове вреди нанася черешовата муха. Инсектицидното третиране срещу този вредител следва да се провежда в началото на оцветяването на плодовете на черешата.

Източник: НИМХ