

Крушовият пъпкопробивач нанася сериозни поражения не само по крушата

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.10.2018 Брой: 10/2018



Крушовият пъпкопробивач (*Anthonomus pyri* Kollar) е разпространен в цялата страна и причинява сериозни поражения не само по крушата, но и по ябълката, кайсията и сливата.

Неприятелят е дребно хоботно бръмбарче, което развива едно поколение годишно. Снася яйцата си в пъпките на крушата през есента и зимуват там като яйца. Излюпените през пролетта ларви изцяло повреждат плодните пъпки, в резултата на което от тях не се развива нито един цвят. Повредените плодни пъпки по време на цъфтежа не се развиват, изсъхват и опадват.

Борба

Борбата се води срещу възрастните бръмбари, преди да са снесли яйцата си – в края на септември-началото на октомври. След 20 септември най-добре е да се правят проверки чрез стръскване и когато на дървото се установят средно повече от 5-8 бръмбара, да започне пръскането, което да завърши в срок от 5-6 дни.

В крушови градини, където не е провеждана редовна борба срещу неприятелите, обикновено се размножава крушовият пъпкопробивач и плътността му често надвишава икономическия праг на вредност- 5-8 броя на дърво, което налага да се пръска срещу възрастните преди яйцеснасянето с Дурсбан 4Е – 0,15% или Вазтак нов 100ЕК – 0,0125% и др. Борбата срещу този неприятел е ефискасна само срещу възрастните форми в началото на есента. По-късно ларвите на крушовия пъпкопробивач се развиват в пъпките и повредите се откриват през пролетта, когато борбата срещу тях е вече невъзможна.