

В сентябре агрометеорологические условия будут определяться температурой выше климатических норм и осадками около и ниже месячной нормы.

Растителна Защита

Дата 08.09.2026 | Выпуск 9/2026 | ISSN 2815-522X | Язык RU

www.plant-protection.com/article/2462?lang=ru



Осадки, выпавшие в августе, носили локальный характер, и на большей части территории страны, за исключением некоторых районов северо-восточных и юго-западных регионов, составили менее 30% от месячной нормы.

В течение первой и в начале второй декады сентября прогнозируются кратковременные осадки, однако после углубления летней засухи они не приведут к значительному изменению состояния верхних слоёв почвы. Во многих местах полевых регионов сухая и уплотнённая почва также и во второй половине сентября будет препятствовать проведению глубокой вспашки и предпосевной обработки участков, предназначенных для посева озимых культур. Ожидаются задержки с посевом озимого рапса — культуры, требующей точной агротехники. Оптимальный агротехнический срок для посева рапса — до конца второй декады сентября.

В течение первой декады сентября агрометеорологические условия будут определяться температурами выше климатических норм, что ускорит прохождение заключительных фаз развития поздних сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. В течение первой декады сентября у среднепоздних гибридов кукурузы будет наблюдаться полная спелость, а у некоторых поздних гибридов — восковая спелость.



В результате превышающих норму летних температур раньше обычных сроков белые виноградные сорта достигнут технологической зрелости, а некоторые из ранних осенних сортов яблок: Голден Пармен, Джонатан, Ред Делишес, Голден Делишес, Канадский ренет и другие плодовые деревья — съёмной зрелости. Прогнозируемая солнечная и тёплая погода в большинстве дней месяца будет предпосылкой для синтеза и накопления большего количества сахаров в винограде и плодах плодовых деревьев.



В полевых регионах условия будут благоприятными для очистки участков от более поздних пропашных культур, для сбора урожая винограда и проведения уборки подсолнечника. В настоящее время урожайность подсолнечника в Восточной Болгарии варьируется в широких пределах. В некоторых местах северо-восточных регионов, на Силистренской сельскохозяйственной станции, получена урожайность свыше 370 кг/дка, а в части юго-восточных регионов, на Карнобатской сельскохозяйственной станции, — ниже 220 кг/дка.

Метеорологические условия в течение сентября ограничат развитие грибковых заболеваний, за исключением мучнистых рос. В овощных культурах позднего полевого производства не следует недооценивать опрыскивания для защиты растений против клещей, капустной моли и хлопковой совки, которые наносят ущерб и ухудшают качество урожая овощей.



Грушевый почковый долгоносик (Anthonomus pyri)

В течение месяца вредоносная деятельность большей части вредителей на плодовых культурах завершается. В конце сентября желательно обследовать грушевые насаждения на наличие опасного вредителя — грушевого почкового долгоносика. Борьба с этим вредителем эффективна только ранней осенью против взрослых особей. При плотности вредителя выше экономического порога вредоносности (3 жука на дерево) необходимо провести обработку.

В течение сентября критические минимальные температуры не прогнозируются, и условия позволят сформировать дополнительную продукцию от поздних овощных культур, подлежащих бланшированию.

Подробнее по теме:

Не недооценивайте вредителей на груше осенью