

Боксёр Эво: чистый старт для зерновых культур

syngenta, България

Дата 21.09.2026 | Выпуск 9/2026 | ISSN 2815-522X | Язык RU

www.plant-protection.com/article/2470?lang=ru



Boxer Evo — новый гербицид от Syngenta, разработанный в ответ на одну из главных проблем в посевах зерновых культур: засорённость сорняками. Продукт сочетает два действующих вещества — прозульфокарб и дифлуфеникан — с сильным синергизмом между ними, что обеспечивает надёжный и широкоспектральный контроль сорняков.

При применении до всходов или в раннюю послевсходовую фазу (осенью) Boxer Evo устраняет конкуренцию сорняков с самого начала и даёт пшенице, ячменю, ржи и тритикале чистый старт и хорошие условия для развития.

Ключевые преимущества:

Высокоэффективный ранний контроль широкого спектра злаковых и двудольных сорняков

Отличный контроль сложных злаковых сорняков: плевел, овсюг, костёр, щетинник, мятлик однолетний (до и после всходов)

Надёжная эффективность против двудольных сорняков: вероника полевая, фиалка трёхцветная, подмаренник цепкий, ромашка, василёк и другие

Два различных механизма действия для повышения эффективности и устойчивого контроля

Отличный партнёр для управления резистентностью, в том числе в трудно контролируемых популяциях

Boxer Evo — это основа, на которой growers могут строить.

Механизм действия

Boxer Evo сочетает два действующих вещества с двумя различными механизмами действия:

Прозульфокарб подавляет деление клеток, а также появление и развитие сорняков. Он поглощается главным образом корневой системой растений, при этом основной эффект достигается при поглощении через гипокотиль. Поглощается из почвы через корни.

Дифлуфеникан нарушает синтез каротиноидов, вызывая разрушение хлорофилла.

Сочетание двух различных механизмов действия обеспечивает более высокую эффективность и является ключом к устойчивому управлению резистентностью.

Интегрированная технология управления резистентными формами плевела

Контроль в два ключевых момента развития зерновых культур:

Осень, Boxer Evo: 300 мл/га, до всходов или после всходов (1-2-й лист)

Весна, Avoxa: 160-180 мл/га

Преимущества осенней обработки: уничтожение прорастающих и всходящих сорняков осенью, сокращение банка семян сорняков в почве, создание условий для чистого старта и хорошего развития культурных растений.

Преимущества весенней обработки: устранение конкуренции со стороны всходящих сорняков, снижение негативного эффекта конкуренции, сохранение потенциала урожайности на единицу площади.

Два различных механизма действия в два ключевых момента означают более высокую эффективность и снижение плотности засорённости.

Зарегистрирован для: пшеница, ячмень, рожь, тритикале

Срок применения согласно ВВСН

Почвенное или раннее вегетативное применение при ВВСН 00-09 (до всходов) или ВВСН 10-13 (1-2-й лист), доза 300 мл/га.

Подтверждённая эффективность на опытных полях Syngenta Болгария

Результаты почвенного и раннего вегетативного применения в сезоне 2024-2025 гг. в Юго-Центральной Болгарии (село Отец Кирилово) и Северо-Восточной Болгарии (город Попово) с чётко выраженной эффективностью по сравнению с необработанным контролем.

Рекомендации по применению

Почвенное или раннее вегетативное (1-2-й лист)

Доза применения: **300 мл/га**

Объём воды: **16-30 л/га**

Узнайте больше о **Boxer Evo** от Syngenta!

