

九月份，农业气象条件将由高于气候常态的温度以及接近或低于月常态的降水量决定。

Растителна Защита

日期 08.09.2026 | 期号 9/2026 | ISSN 2815-522X | 语言 ZH

www.plant-protection.com/article/2462?lang=zh



八月份的降水量为局部性降水，全国大部分地区（东北和西南地区的部分地区除外）降水量低于月均值的30%。

预计九月上旬及中旬初将有短期降水，但在夏季干旱加剧之后，这不会导致上层土壤状况发生显著变化。在田间地区的许多地方，干燥板结的土壤在九月下半月仍将阻碍对计划种植越冬作物的地块进行深翻和播前整地。预计冬油菜的播种将会推迟——这是一种需要精细农业技术的作物。油菜播种的最佳农技期为九月下旬之前。

在九月上旬，农业气象条件将由高于气候常值的温度决定，这将加速晚熟品种和杂交农作物发育最后阶段的进程。九月上旬，中晚熟玉米杂交种将进入完熟期，部分晚熟杂交种将进入蜡熟期。



由于夏季气温高于正常水平，白葡萄品种将比通常时间更早达到工艺成熟度，部分早秋苹果品种：金帕门、乔纳金、红元帅、金冠、加拿大雷内特及其他果树也将提前达到采收成熟度。预计本月大部分日期天气晴朗温暖，这将有利于葡萄和果树果实中更多糖分的合成与积累。



在田间地区，条件将适合清理晚熟中耕作物的地块、采收葡萄以及进行向日葵收获。目前，保加利亚东部向日葵的产量差异很大。在东北部地区的一些地方，锡利斯特拉农业试验站获得了超过370公斤/亩的产量，而在东南部部分地区，卡尔诺巴特农业试验站的产量低于220公斤/亩。

九月份的气象条件将限制真菌病害的发展，白粉病除外。在晚季露地生产的蔬菜作物中，不应低估针对蚜虫、菜蛾和棉铃虫的植保喷药，这些害虫会造成损害并降低蔬菜收成的品质。



梨芽象甲 (*Anthonomus pyri*)

本月内，果树作物上大部分害虫的危害活动将结束。九月底，建议对梨树种植园进行检查，以确定是否存在一种危险害虫——梨芽象甲。针对该害虫的防治仅在初秋对成虫有效。当害虫密度超过经济危害阈值（每棵树3头成虫）时，有必要进行药剂处理。

九月份预计不会出现临界最低温度，条件将有利于晚季蔬菜作物（需软化处理）形成额外产量。

更多相关话题：

不要低估秋季梨树上的害虫