

拳击手Evo：谷物作物的清洁起步

syngenta, България

日期 21.09.2026 | 期号 9/2026 | ISSN 2815-522X | 语言 ZH

www.plant-protection.com/article/2470?lang=zh



Boxer Evo 是先正达新推出的除草剂，专为应对谷物作物中的主要挑战之一——杂草侵染而研发。该产品结合了两活性成分——戊硫代氨基甲酸酯和吡氟酰草胺，二者之间具有强协同作用，可提供可靠且广谱的杂草防除效果。

在苗前或苗后早期（秋季）施用，Boxer Evo 从最初阶段就消除杂草竞争，为小麦、大麦、黑麦和黑小麦提供干净的生长起点和良好的发育条件。

主要优势：

对广谱禾本科和阔叶杂草具有高效的早期防除效果

对难防禾本科杂草具有优异防效：黑麦草、野燕麦、雀麦、狗尾草、早熟禾（苗前和苗后）

对阔叶杂草具有可靠防效：田野婆婆纳、野生三色堇、猪殃殃、洋甘菊、矢车菊等

两种不同的作用方式，实现更高防效和可持续防除

抗性管理的理想搭档，包括对难防种群

Boxer Evo 是种植者可赖以建立的基础。

作用方式

Boxer Evo 结合了两具有不同作用方式的活性成分：

戊硫代氨基甲酸酯抑制细胞分裂以及杂草的出苗和发育。它主要被植物根系吸收，主要效应发生在通过下胚轴吸收时。它通过根系从土壤中吸收。

吡氟酰草胺破坏类胡萝卜素合成，导致叶绿素降解。

两种不同作用方式的组合可提供更高防效，并且是可持续抗性管理的关键。

管理抗性黑麦草类型的综合技术

在谷物作物发育的两个关键时期进行防除：

秋季，Boxer Evo：300 毫升/公顷，苗前或苗后（第1-2叶期）

春季，Avoxa：160-180 毫升/公顷

秋季处理的优势：消除秋季萌发和出苗的杂草，减少土壤中的杂草种子库，为作物植株的干净起点和良好发育创造条件。

春季处理的优势：消除出苗杂草的竞争，减少竞争的负面影响，保持单位面积产量潜力。

在两个关键时期采用两种不同作用方式，意味着更高防效和更低的杂草侵染密度。

登记用于：小麦、大麦、黑麦、黑小麦

根据 BBCH 的施用时机

在 BBCH 00-09（苗前）或 BBCH 10-13（第1-2叶期）进行土壤处理或早期营养期施用，剂量为 300 毫升/公顷。

在先正达保加利亚试验田中已验证的防效

2024-2025 季在保加利亚中南部（Otets Kirilovo 村）和保加利亚东北部（Popovo 镇）进行的土壤处理和早期营养期施用结果，与未处理对照相比，防效表现明显。

施用建议

土壤处理或早期营养期（第1-2叶期）

施用剂量：**300 毫升/公顷**

用水量：**16-30 升/公顷**

了解更多 关于 **Boxer Evo** 来自先正达！